

如有以上任何问题，请尽快前往医疗保健提供者处就诊，由其开具治疗衣原体感染的药物。

○ 罹患任何严重的慢性健康问题，例如肾病、心脏病或肝病；罹患癫痫；或正在使用血液稀释剂。

○ 罹患任何严重的慢性健康问题，例如肾病、心脏病或肝病；罹患癫痫；或正在使用血液稀释剂。

○ 奇霉素 (Zithromax)、红霉素或克拉霉素 (Biaxin) 等任何抗生素过敏。

○ 对此药过敏或曾出现过不良反应、皮疹或者对阿奇霉素 (Zithromax)、红霉素或克拉霉素 (Biaxin) 等任何抗生素过敏。

○ 小便时有灼热感、恶心、发烧或睾丸疼痛。

○ 性行为期间疼痛或出血，或者非经期出血。

○ 下腹部疼痛、抽筋、阴道分泌物异常并伴有异味、性行为期间疼痛或出血，或者非经期出血。

如出现以下任何情况，**请勿**服用阿奇霉素：

○ 治疗药物是名为“阿奇霉素”的抗生素。此药用于

治疗衣原体感染，但不适用于其他 STI。此药非常安全，若正确服用，几乎 100% 有效。

这是什么药物？



衣原体感染是一种经性交、肛交或阴道性交传播的性传播感染病 (Sexually Transmitted Infection, STI)。

衣原体感染是一种经性交、肛交或阴道性交传播的性传播感染病 (Sexually Transmitted Infection, STI)。衣原体感染通常没有任何症状。如果出现症状，可能包括小便时疼痛或灼烧，以及阴茎、阴道或肛门流脓或有分泌物。即便您没有症状，亦可能将衣原体传染给其他人。如果不接受相关治疗，衣原体感染会导致严重健康问题。

什么是衣原体感染？

您的某位性伴侣被诊断为衣原体感染 (Chlamydia，发音为 kiah-MIH-dee-ah)，并已接受相关治疗。衣原体感染是一种经性交、肛交或阴道性交传播的传染病。医疗保健提供者要求您的性伴侣向您转交用于治疗衣原体感染的处方或药物。您同样需要接受治疗，以免发展为严重健康问题、重新传染给您的性伴侣或传染给其他人。

您的某位性伴侣被诊断为衣原体感染 (Chlamydia，发音为 kiah-MIH-dee-ah)，并已接受相关治疗。衣原体感染是一种经性交、肛交或阴道性交传播的传染病。医疗保健提供者要求您的性伴侣向您转交用于治疗衣原体感染的处方或药物。您同样需要接受治疗，以免发展为严重健康问题、重新传染给您的性伴侣或传染给其他人。

为何我会得到这个处方或药物？

加急伴侣治疗 (Expedited Partner Therapy, EPT)

伴侣指南

为何我应该服用此药？

如果不接受治疗，衣原体感染可能导致严重健康问题，例如：

- 不孕不育 —— 无法生育子女
- 异位妊娠 —— 宫外孕，可能会危及生命
- 睾丸感染，会导致疼痛和发烧
- 盆腔炎 (Pelvic Inflammatory Disease, PID) —— 一种影响子宫、输卵管和卵巢的疼痛型疾病

我应该如何服用此药？

- 此为口服药物。请勿转给他人服用。您需要接受完整疗程方能见效。
- 空腹服用（饭前至少一小时或饭后至少两小时服用）
- 如果您在服药后一小时内呕吐，则需要重新服用一次药物，因为此时药物可能还未起作用。如需获取更多药物，请致电处方所列的电话号码或造访诊所或医疗保健提供者。

此药是否能够治疗所有 STI？

否，此药**只能**用于治疗衣原体感染。

服药后该怎么做？

- 您**和**您的性伴侣在接受治疗后至少七天内不得进行口交、肛交或阴道性交行为。药物需要七天方能见效。
- 请前往医生处就诊，并接受包括艾滋病毒 (HIV) 在内的其他 STI 检查。请务必接受针对其他 STI 的检查，因为此药只能治疗衣原体感染。

如果我认为我没有受到衣原体感染，该怎么办？

即便感觉自己非常健康且无任何症状，也有可能已受到衣原体感染。您可以接受检查，以确定是否已受到衣原体感染。但是，您现在仍应服用药物。

更安全的性行为

STI 较为常见，每年都有数百万人罹患 STI。每次进行口交、肛交或阴道性交时，只要正确使用乳胶避孕套，即可预防大部分 STI。

我如何确知此药是否真的是阿奇霉素？ 如果我有疑问，该怎么办？

您可以致电药物或处方所列的电话号码或访问 nyc.gov/health/ept，以寻找问题答案。

如果我已怀孕或认为自己可能已怀孕，该怎么办？

阿奇霉素对孕妇而言非常安全，可防止胎儿在妊娠期和分娩时受到感染。您还应该尽快前往医疗保健提供者处就诊，并向其告知，您因为性伴侣感染衣原体而接受了衣原体感染治疗。您还应该要求进行其他 STI 检查，因为部分疾病会传染给胎儿。

我从我的伴侣处收到了处方。我去药房时，可能会怎样？

当您带着处方前去药房时，药剂师可能会询问您的姓名、地址、出生日期和付款方式（例如保险、共付额或自付费）。

此药是否会产生副作用？

有可能。如出现副作用，可能包括腹泻、恶心、胃痛、头痛和呕吐。这些都较为常见，且不会有任何危险。

如果您在服用阿奇霉素后一小时内呕吐，则需要重新服用一次药物，因为此时药物可能还未起作用。如需获取更多药物，请致电处方所列的电话号码或造访诊所或医疗保健提供者。

是否有任何非常危险的副作用？

此类情况非常罕见，但部分人群确实会对阿奇霉素产生严重过敏反应。这些反应会导致呼吸困难、胸闷、喉咙闭合、嘴唇或舌头肿胀以及荨麻疹（皮肤出现瘙痒肿块）。如果服药后出现以上任何症状，请立即致电 **911** 或前往最近的急诊室。

如果我无法支付药物费用，该怎么办？

请前往 NYC 性健康诊所，并向其告知您的性伴侣患有衣原体感染。如需查找诊所，请致电 **311** 或访问 nyc.gov/health/clinics。