

加急伴侣治疗 (Expedited Partner Therapy,

患者指南

0

事合同" 代各峽夜。 51 半 對 內 窓 鈴 交 峽 珍 爽 衣 衣 及 內 。肃栾寺的番寺交到彭即旋交用,交口经种一景菜 代音式, (Chlamydia, 英哥本南本代祂診跡感

%001 平八 ,用鴉腳五苔,全安常非預加, "素

5菜葱本原衣景之十

愿本息办, 社会关助受新不果成。人
此其餘梁
計本 门用海道的, 至时众以, 款戍海酃秀时動心括戶銷 本。(ITS ,noitoelnly Transmitted Infection, STI)。本 的番卦交對彭即旋交用,交口经种一景栾葱本原衣

。强问퓗墅重严姪导会采

: 亚班

- 。栾驷下咥受 銷厄出衣校且并、ITS 桥一景菜葱本原衣、释稱其 向。守谷关肺受姧与共,梁愿本息办武郡诊쨄驱 , 厌苦人可丑的代行却好育内目个两去好卦感向 ○
- 的恋给交册封宣《南部引料》及以ल孩旋式处斜 🔾
- 。代例不亦ल啓用弸卦五衣权動调,查剑IT2 蚧 其受驽共, 诊旒祝念旋主厾去硝品料封饱感励薳 ○

型行抵影不内天ナ司 京 会 放 完 五 計 料 付 窓 休 窓 ○ : 当之

- 忍本
 司
 办
 査
 会
 所
 重
 以
 、
 会
 抗
 収
 主
 到
 去
 前
 引
 目
 个
 三
 。代刊
- 。沢青琛

我该如何向我的性伴侣告知,我已接受衣原体 感染的相关治疗?

将您罹患 STI 一事告知您的性伴侣可能很难,但对方需要接受相关治疗,以免重新传染给您或其他任何性伴侣。尽量对您的性伴侣保持开诚布公的态度。您可以说:

"我最近发现我患上一种名为衣原体感染的 STI。因为我们有过性行为,你可能也感染了。现在没法确认是谁先感染。你应该服用这种药物,另外还要阅读药物随附的《伴侣指南》宣传册。记得前往医疗保健提供者处就诊,以接受其他 STI 检查。"

您的性伴侣可能会感觉尴尬、羞愧、内疚、生气或 害怕。这些都很正常。敦促对方接受治疗,表示您 关心并且愿意帮忙。

如果我的性伴侣生气,该怎么办?

您的伴侣可能会生气,并责备您导致其受到衣原体感染,但事实可能并不是您传染给对方。衣原体感染者通常没有任何症状,所以可能长久患病而不自知。大多数时候,都无法确知是谁先感染。最为重要的是,请将您的感染情况如实告知您的性伴侣,敦促其接受相关治疗,以免出现严重健康问题。

如果我的性伴侣出现暴力倾向,该怎么办?

如果您认为您的性伴侣可能出现暴力倾向,那么您不应该将处方或药物交给对方。如果性伴侣威胁您或出现暴力倾向,请立即致电 911。

我的性伴侣如何确知服用药物是否安全? 如果对方有疑问,该怎么办?

您的性伴侣可以阅读宣传册(《伴侣指南》)、致电处方所列的电话号码或访问 nyc.gov/health/ept。

更安全的性行为

STI 较为常见,每年都有数百万人罹患 STI。 每次进行口交、肛交或阴道性交时,只要正 确使用乳胶避孕套,即可预防大部分 STI。

如果我的性伴侣没有症状,是否也应该服用药物?

是的。衣原体感染者可能没有任何症状,而服用药物方能治愈此病。

如果我的某位性伴侣已经怀孕或者认为可能已怀 孕,该怎么办?

如果您的某位性伴侣已经怀孕或者认为可能已怀孕,那么对方应该服用此药。阿奇霉素对于孕妇而言非常安全,可防止胎儿在妊娠期和分娩时受到感染。对方还应该尽快前往医疗保健提供者处就诊,并接受其他 STI 检查,以免传染给胎儿。

将处方或药物交给我的性伴侣之后,我该怎么办?

药物需要七天才见效。**您和您的性伴侣在接受治疗后至少七天内不得进行口交、肛交或阴道性交行为。**如果您在自己和性伴侣治愈之前发生性行为,可能会再次感染衣原体。

我的性伴侣去药房时,可能会怎样?

如果您的性伴侣前往药房递交处方或领取药物,药剂师可能会向其询问一些信息,例如其姓名、地址、出生日期和付款方式(例如保险、共付额或自付费)。

如果我的性伴侣不服用药物,该怎么办?

如果性伴侣未服用药物,那么对方应该尽快前往医疗保健提供者处就诊,并接受衣原体感染检查和治疗。向您的伴侣告知,倘若不接受治疗,会导致严重健康问题。同时,在对方完成治疗后七天内,请勿与其发生性行为。

如果我无法将药物交给所有性伴侣,该怎么办?

如果您无法将药物交给所有性伴侣,请将药物归还 给向您提供药物的医生、护士或诊所。请勿转给他 人服用。您自己需要接受衣原体感染治疗,您的伴 侣同样如是。