




# RABIA

CÓMO PROTEGER A SU MASCOTA



# CÓMO PROTEGER A SU MASCOTA DE LA RABIA

## Preguntas frecuentes

### ANTECEDENTES

#### ¿Qué es la rabia?

La rabia es un virus que ataca el cerebro de los seres humanos y de los animales. Casi siempre es mortal, pero se puede prevenir.


#### ¿Cómo se transmite la rabia?

La manera más frecuente de transmisión de la rabia es por medio de la saliva de un animal rabioso cuando muerde a una persona o a otro animal. Cualquier mamífero o ser humano se puede infectar de rabia, pero las vacunas contra la rabia pueden ayudar a proteger a gatos, perros y personas contra la infección.

#### ¿Cuáles animales generalmente transmiten la rabia?

En la Ciudad de Nueva York, los mapaches y los murciélagos por lo general son los responsables de transmitir la rabia.

En los cinco distritos, cientos de animales han dado positivo para la rabia. La mayoría eran mapaches, pero gatos callejeros, zarigüeyas y zorrillos también han dado positivo. Para obtener los datos más recientes de la Ciudad de Nueva York, visite [nyc.gov/health/rabies](https://nyc.gov/health/rabies).



**Ha habido casos de rabia en los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York, en su mayoría en mapaches y murciélagos.**

## SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN

### ¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

Debido que la rabia ataca el cerebro, los animales rabiosos a menudo actúan de forma extraña. Los síntomas ocurren repentinamente y pueden incluir cambios en el comportamiento (como retraimiento o agresión extrema), evitar la comida y el agua, mayor secreción de babas y dificultad para caminar.



### ¿Cómo puedo proteger a mi perro o gato?

- **Vacune** a sus perros y gatos; es la ley. En la Ciudad de Nueva York, todos los cachorros de perros y gatitos deben recibir su primera vacuna contra la rabia entre los 3 y 4 meses de edad. También deben recibir una vacuna de refuerzo un año después y luego nuevamente cada uno a cuatro años, dependiendo de la vacuna que se utilice. Incluso los perros y gatos que viven dentro de la casa corren riesgo si salen o si un murciélago rabioso entra a su casa.
- Registre a su perro. Es la ley y es la mejor manera de ayudar a encontrar su perro si se pierde.
- Póngale una correa y supervise a su perro en lugares públicos.

**La vacuna contra la rabia es la mejor manera de proteger a su mascota de la rabia.**



## SALUD PÚBLICA

### ¿Qué sucede si un animal salvaje o cualquier otro animal que pudiera tener rabia muerde a mi perro o gato?

- Si se puede capturar al animal que lo mordió, llame al 311 para averiguar si le deben hacer una prueba de rabia y para hacer los arreglos para la captura.
- Comuníquese con su veterinario de inmediato.
- Si su mascota tiene una vacuna vigente contra la rabia, recibirá una vacuna de refuerzo. Tendrá que encerrar y observar a su mascota en su casa durante 45 días.
- Si su mascota no está vacunada o se le ha vencido la vacuna, es posible que la pongan en cuarentena por varios meses en un hospital veterinario. Si se sospecha que su mascota tiene rabia, es posible que tengan que recurrir a la eutanasia.



### ¿Qué sucede si mi perro o gato muerde a alguien?

Dele su información de contacto a la persona mordida y supervise a su mascota en casa durante diez días para ver si tiene síntomas de rabia (incluso si su mascota está vacunada). El Departamento de Salud se comunicará con usted para darle seguimiento. Si su mascota no muestra ningún síntoma, la persona mordida no necesitará vacunas para prevenir la rabia.



**Para reportar mordidas de animales o para recibir más información acerca de la rabia, llame al 311.**



**Cualquier mordida de un animal salvaje o callejero se debe considerar una posible exposición a la rabia.**

### **¿Qué debo hacer si estoy expuesto a la rabia?**

Si lo muerde un animal salvaje o callejero o si está expuesto a un murciélago, comuníquese con un médico de inmediato. Si el animal da positivo para rabia o si no se le puede hacer la prueba, es posible que tengan que administrarle las vacunas para prevenir la rabia. Esto normalmente conlleva una vacuna llamada inmunoglobulina antirrábica (*Rabies Immune Globulin, RIG*) en el sitio de la mordida y una serie de vacunas contra la rabia a lo largo de un período de dos semanas.

**Para obtener más información acerca de la rabia, visite [nyc.gov/health](https://nyc.gov/health) o llame al 311.**



**En Estados Unidos, los murciélagos son responsables por la mayoría de los casos de rabia en seres humanos. Si encuentra un murciélago en su casa, llame al 311 para ver si le deben hacer la prueba de la rabia.**



**NYC**<sup>TM</sup>  
Health