

狂犬病曝露後預防性投藥 (PEP) 相關資訊

狂犬病是因被受狂犬病感染的動物咬而傳播的致命疾病。如果您曾被感染或疑似感染狂犬病病毒的動物咬傷*，則可能需要接受狂犬病曝露後預防性投藥 (PEP)。經由適當的 PEP，狂犬病完全可以預防。†

什麼是狂犬病 PEP？

- 狂犬病 PEP 包含一劑人類狂犬病免疫球蛋白 (human rabies immune globulin, HRIG) 以及在兩週內接種完畢的四劑狂犬病疫苗。HRIG 可提供即時保護，而疫苗則可協助您身體的免疫系統抵禦病毒。
- 如果您之前曾經接種過狂犬病疫苗（即之前因為動物咬傷或接觸而接受過狂犬病曝露前預防投藥或狂犬病 PEP），則您只需要在三天內接種兩劑狂犬病疫苗，而不需要接種 HRIG。

當您前往急診室就診時，請攜帶這份資訊說明並以後附的檢查清單作為參考。如果您或健康照護提供者對於 HRIG、狂犬病疫苗或這些藥物的輸注方式有任何疑問或疑慮，請撥打 **紐約市 (NYC) 衛生局** 的電話號碼：**347-396-7955**。

請記住，您是保障自身及親友健康的最佳倡導者。

如需深入瞭解 NYC 狂犬病資訊，請造訪 nyc.gov/health/rabies。

NYC 衛生局並不承擔狂犬病疫苗的費用。請向您的醫療照護提供者及健康保險公司諮詢保險覆蓋範圍的相關資訊。如需深入瞭解平價或免費健康照護選項的詳細資訊，請造訪 nychealthandhospitals.org/hospitals 以聯絡 NYC 健康醫療總局屬下醫院或致電 **311**。

**如果您因為新傷口或黏膜（嘴巴、眼睛或鼻子）可能被罹患狂犬病動物的唾液污染而有感染狂犬病的風險，或是您曾經被蝙蝠咬過，我們也建議您接受狂犬病 PEP。

† 狂犬病疫苗和 HRIG 不常出現有害的副作用。狂犬病疫苗的輕微反應可能包括注射部位出現疼痛、紅腫、腫脹或發癢等現象。也有人報告過頭痛、嘔吐、腹痛、肌肉疼痛和頭暈等症狀，但極為少見。接受 HRIG 治療之後，注射部位可能會發生疼痛並伴隨低燒。

對於從未接種過狂犬病疫苗的人

| | |
|-------------------------------------|---|
| 立即處理傷口 | <input type="checkbox"/> 清潔並輕輕地清洗傷口 15 分鐘，以協助除去灰塵和消滅病菌。 <input type="checkbox"/> 如果距離您上次注射破傷風疫苗的時間已經超過 10 年，也請考慮再接再種一次。 <input type="checkbox"/> 請向您的醫師諮詢，針對需要用藥、縫合或手術的重傷，醫師將確定最佳治療方案。 |
| 起始日 您接種第一劑狂犬病疫苗的當天被視為起始日。 | <input type="checkbox"/> 人類狂犬病免疫球蛋白 (HRIG) <ul style="list-style-type: none"> • HRIG 的劑量會依據您的體重而定。患者的體重越重，劑量就越高。 • 應該將 HRIG 注射到傷口處和附近的部位。如有剩餘的 HRIG，應將之注射到有較大塊肌肉的部位，如手臂、臀部或大腿。 • 不應將 HRIG 注射到接種狂犬病疫苗的另一部位。 <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 1 劑 <ul style="list-style-type: none"> • 不應該在注射 HRIG 的另一部位注射狂犬病疫苗第 1 劑。 • 應該將狂犬病疫苗的所有劑量都注射到手臂肌肉中。若接種者是兒童，也可以注射到大腿肌肉中。 |
| 第 3 天 | <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 2 劑 <ul style="list-style-type: none"> • 可以在起始日注射 HRIG 的部位注射狂犬病疫苗的所有其他劑量。 |
| 第 7 天 | <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 3 劑 |
| 第 14 天 | <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 4 劑 |
| 第 28 天 | <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 5 劑 <ul style="list-style-type: none"> • 可能僅對免疫系統低下的人注射。 |

附註：在表中建議時間的前後幾天內接種也可以。下一次狂犬病疫苗接種延遲（或提前）二或三天的患者應繼續接種系列疫苗並保持注射劑量的建議間隔時間。

對於之前接種過狂犬病疫苗的人[‡]

| | |
|-------------------------------------|--|
| 立即處理傷口 | <input type="checkbox"/> 清潔並輕輕地清洗傷口 15 分鐘，以協助除去灰塵和消滅病菌。 <input type="checkbox"/> 如果距離您上次注射破傷風疫苗的時間已經超過 10 年，也請考慮再接再種一次。 <input type="checkbox"/> 請向您的醫師諮詢，針對需要用藥、縫合或手術的重傷，醫師將確定最佳治療方案。 |
| 起始日 您接種第一劑狂犬病疫苗的當天被視為起始日。 | <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 1 劑 <ul style="list-style-type: none"> • 應該將狂犬病疫苗的所有劑量都注射到手臂肌肉中。若接種者是兒童，也可以注射在大腿肌肉中。 |
| 第 3 天 | <input type="checkbox"/> 狂犬病疫苗第 2 劑 |

[‡]包含接受過狂犬病曝露前預防投藥的人，例如獸醫和動物管制員，或是之前因為動物咬傷或有狂犬病感染風險而接受狂犬病 PEP 的任何人。